



Nombre de la especie:

- **Común:** Oreja de ratón, hierba del cáncer, cáncer, culo de mona, yerba de clavo, yerba de cuarto, penny-wort.
- **Científico:** *Centella erecta (L. F.) Fern*

Familia a la que pertenece: **Apiaceae.**

Parte utilizada: Follaje

Descripción botánica: Hierba perenne con tallos de 2 a 5 cm de largo o más, postrados y enraiza en los nudos, los cuales emiten grupos de hojas con peciolos largos (3 a 30 cm). Hojas aovadas u orbiculares, algo gruesas, no peltadas, de 2 a 7 cm de diámetro y repando-dentadas. Las flores emergen junto a las hojas de los nudos, agrupadas en umbelas. Fruto de 4 a 5 mm de ancho y 3 mm de alto, acostillado y reticulado¹.

Hábitat y Distribución geográfica: Natural de trópicos y subtrópicos de todo el mundo. Crece de forma natural en lugares húmedos y cenagosos (orillas de ríos, canales de regadíos y desagües)².

Parámetros agrotécnicos: No se establecen

Composición química: Sin información de su composición.

Usos: **Aún no probados:** Diurética, narcótica, antihemorroidal, antipirética, antivenérea. Contra la lepra y otras afecciones de la piel³

Actividades Farmacológicas demostradas: Sin efectos terapéuticos comprobados².

Toxicidad: Esta planta contiene un veneno violento de sabor amargo, narcótico y acre, sucedáneo de la cicuta acuática de Europa⁴

Reacciones Adversas y Contraindicaciones: Planta tóxica, no se señalan

Interacciones con alimentos o medicamentos: No se señalan

Bibliografía:

1. Fuentes, V. N. et al.: Plantas medicinales de uso popular referidas como tóxicas. Boletín de reseñas. Plantas medicinales 19:37, 1988.
2. Fitomed. <http://www.sld.cu/servicios/medicamentos>

3. Monografías de plantas medicinales. (http://www.sld.cu/galerias/doc/monografias_plantas_medicinales.doc). Asociación Argentina de Fitomedicina (Base De Datos)
1. Marrero E., Alfonso, H., Fuentes, V., Sánchez LM., Palenzuela I. Plantas Tóxicas en el Trópico. Edi Censa. 2007.